

УДК: 616.895.87 - 008.44 – 07

*А.Г. Бондарчук***АУТОДЕСТРУКТИВНІ ДІЇ ХВОРИХ НА ПАРАНОЇДНУ ШИЗОФРЕНІЮ ЯК ПАТОПЛАСТИЧНИЙ ФАКТОР ПОДАЛЬШОГО ПЕРЕБІГУ ЗАХВОРЮВАННЯ**

Харківський державний медичний університет

Проблема профілактики, прогнозу та корекції аутоагресивних дій несуйцидального характеру у осіб, які страждають на психічні розлади, знаходиться в центрі уваги як вітчизняних, так і закордонних дослідників.

Мета. Дослідити вплив несуйцидальної аутоагресивної поведінки на перебіг захворювання у хворих на параноїдну шизофренію на підставі вивчення закономірностей її формування; динаміки та клініко-психопатологічних особливостей захворювання.

Методи. Клініко-психопатологічне дослідження, стандартна анкета «параноїдного хворого» (Бачериков М.Є., Бачериков А.М.), статистичний метод.

Результати. Обстежено 23 хворих на параноїдну шизофренію з тяжкими проявами несуйци-

дальної аутоагресивної поведінки. У групі з 18 хворих (78,3%) безпосередньо в результаті реалізації самопошкодження спостерігалась тенденція до вкрай швидкої редуції продуктивної симптоматики, після тривалого періоду загострення. Група хворих із нереалізованими аутодеструктивними проявами - 5 хворих (21,7%). У цій групі аутодеструктивні дії були попереджені своєчасним втручанням рідних або медичного персоналу, та протягом подальшого часу спостерігалися неодноразові тенденції до самопошкодження.

Важкі форми аутодеструктивної поведінки (самоосліплення, аутокастрація, серйозні самопорізи та ін.) приводять до тяжких травм та інвалідизації, що значно знижує якість подальшого життя хворого.

Поступила в редакцію 28.05.2004